

(11)Publication number:

02-200610

(43)Date of publication of application: 08.08.1990

(51)Int.CI.

A61K 7/00

(21)Application number : 01-016185

(71)Applicant: NICHIREI CORP

(22)Date of filing:

27.01.1989

(72)Inventor: TAKEDA KAZUO

ARA TAKASHI

#### (54) COSMETIC CONTAINING ACEROLA ESSENCE

### (57)Abstract:

PURPOSE: To obtain a cosmetic abundantly containing natural L-ascorbic acid having various physiological and pharmacological effects such as reinforcing of tissue or blood capillary or inhibiting of melanin formation and having excellent stability containing essence extracted from fruit of acerola.

CONSTITUTION: Essence extracted from fruit of acerola containing various useful substances such as various vitamins, organic acids, minerals, flavonoid glycoside and pectin in a large amount, especially content of L-ascorbic acid is ≥1.0% in average as large as not seen in other fruit, etc., and having excellent stability is mixed with cosmetic as raw material of cosmetic to afford the cosmetic having whitening effect by tyrosinase activity-inhibiting effect of L-ascorbic acid, activating effect to skin and blood capillary and also water—retentive effect or astringent effect by amino acid, organic acid, sugar and pectin, and furthermore also utilizable of scent of the above-mentioned essence.

## ⑲ 日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公開

# ② 公 開 特 許 公 報(A) 平2-200610

®Int. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

④公開 平成2年(1990)8月8日

A 61 K 7/00

K 7306-4C H 7306-4C X 7306-4C

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全3頁)

❷発明の名称

アセロラエキスを含む化粧品

②特 題 平1-16185

②出 願 平1(1989)1月27日

@発明者 武田

和夫

東京都目黒区東が丘2-8-18

⑩発明 者

荒

剛史

千葉県柏市大室1086-58

勿出 願 人 株式会社ニチレイ

東京都千代田区三崎町3丁目3番23号

#### 明細、曹

1. 発明の名称

アセロラエキスを含む化粧品

2. 特許請求の範囲

アセロラの果実より抽出したエキスを含有する ことを特徴とした化粧品。

- 3 発明の詳細な説明
- <産業上の利用分野>

本発明はマルビギア属(Malpighia)の果樹であるアセロラ(Acerola,学名Malpighia glabra し.)の果実より抽出したエキスを含む化粧品に関する。本エキスは天然のレーアスコルビン酸を他の果実エキスよりも多量に含むことが大きな特徴である。
<従来の技術>

従来、L-アスコルビン酸には組織や毛細血管の強化、メラニン形成阻害、あるいはコラーゲンの形成等、数々の生理・薬理作用が知られており、化粧品の分野でも頻繁に利用されている。一方、近年は化粧品原料の一成分として天然物が好まれる傾向が強くなっている。

これまで、天然レーアスコルビン酸を含有する植物抽出液はレモンエキス、リンゴエキス等いくっか知られているが、レーアスコルビン酸 み度を0.1%以上含有している物は殆ど見られない。また、エキス抽出の操作過程で一部分解、減少するのが常である。あるいは 改縮によって 高しーアスコルビン酸合有のものを得ようとすると、更に分解が進むほか、共存する成分も高 設度となってメイラード反応等の化学変化が加わり、黒褐色になるという欠点があった。

<発明が解決しようとしている問題点>

本発明は、新鮮なアセロラ果実由来のレーアスコルビン酸を豊富に含み、かつ安定性にすぐれたアセロラエキスを原料として配合した新規な化粧品を提供することを目的とする。

く問題点を解決するための手段>

アセロラ果実は各種ビタミン、有機酸、ミネラル、フラボノイド配糖体、ペクチンなど、各種の有用物質を含有しているが、なかでもL-アスコルビン酸の含有率が平均1.0%以上あり、(表-1

参照)他の果実等にみられ 程多く、安定性に も優れている。

表1-アセロラ果実成分分析結果

| 分析試験項目           | 結果          |
|------------------|-------------|
| 水分               | 91.8%       |
| たんぱく質            | 0.6%        |
| 脂質               | 0.1%        |
| <b>敬</b> 維       | 0.4%        |
| 灰分               | 0.3%        |
| 糖質               | 6.8%        |
| リン               | 13.9mg/100g |
| 鉄                | 0.17mg/100g |
| カルシウム            | 9.7mg/100g  |
| 総カロチン            | 0.83mg/100g |
| 総アスコルビン酸(総ビタミンC) | 1.58%       |

この事から、多量に含まれている L - アスコルビン酸を失うことなく抽出し、同時にどの様な化粧品に使用する場合にも、この果実の持つ L - アスコルビン酸を安定化させている 成分 構成を出来るだけ活かす形にする抽出方法が必要である。以下に、抽出方法を 2 ~ 3 の例をもって述べる。

#### · < 抽出法1 >

新鮮なアセロラ果実またはその凍結品を水洗し、

- 3 -

の溶媒にて再抽出し、ベクチン等、一部の成分を除去した後、同様にして充填したもの。このエキスは溶媒の粗合せを調整することで含有成分、特にしーアスコルビン酸を、種々の化粧品に配合するとき、その中で最も安定性のよい条件を選ぶことができる。

#### < 作用 >

次に化粧品への使用を実施例によって示すが、本発明は本例のみに限定されるものではない。

れを沪過、デカーテーション等により、 沈 顧 を除去し、清澄な上清を得る。 これをそのまま、あるいは活性炭で脱色を行った後、静置し、その後生じた沈殿を除去した後、孔径 0.22μ aのメンブレンフィルターにて沪過後、 無 菌 充填を行う。 このエキスは、 大 部 分の 水 容 性 成 分 が 含まれて おり、多くの 有 用 成 分 が 存在する。

#### <抽出法2>

抽出法 1 と同様にして得られた懸濁液に、グリセリン、1.3-ブチレングリコール、プロピレングリコール、プロピレングリコール、エタノール、水などの溶媒を単独で、なり、は、ななないはその混合物を抽出溶媒としてる。次に、こびに、では、では、でで過後、無菌を行う。このエキスは、使用で必要を変えることにより、目的に応じたものを選ぶことが出来る。

#### <抽出法3>

.抽出法 1 あるいは 2 にて抽出したエキスを更に他

- 4 -

く実施例I>化粧水の製造方法

| 7      | リ      | セ      | ij          | ン                |            |     |       |     |         |          |     |     |   |   |   |   |   | 5.                | 0 %                  | 6     |
|--------|--------|--------|-------------|------------------|------------|-----|-------|-----|---------|----------|-----|-----|---|---|---|---|---|-------------------|----------------------|-------|
| プ      |        | F.     | V           | ン                | 7          | IJ  | כ     | -   | ル       |          |     |     |   |   |   |   |   | 4.                | 0                    |       |
| オ      | ν      | 1      | ル           | ア                | ル          | כ   | -     | ル   |         |          |     |     |   |   |   |   |   | 0.                | 1                    |       |
| *      | IJ     | オ      | 牛           | シ                | エ          | Ŧ   | ν     | ン   | ソ       | ル        | ť   | 夕   | ン | モ | ) | ラ | ゥ | IJ                | ン                    | 酸     |
|        | エ      | ス      | テ           | ル                |            |     |       |     |         |          |     |     |   |   |   |   |   | 1.                | 5                    |       |
| #      | IJ     | オ      | 牛           | シ                | エ          | チ   | レ     | ン   | ラ       | ゥ        | IJ  | ル   | エ | _ | テ | N |   | 0.                | 5                    |       |
| エ      | 夕      | ,      | _           | ル                |            |     |       |     |         |          |     |     |   |   |   |   | 1 | 0.                | 0                    |       |
| 香      | 料      |        |             |                  |            |     |       |     |         |          |     |     |   |   |   |   |   | 0.                | 1                    |       |
| 着      | 色      | 料      |             | •                |            |     |       |     |         |          |     |     |   |   |   |   |   | 適                 | 量                    |       |
|        |        |        |             |                  |            |     |       |     |         |          |     |     |   |   |   |   |   |                   |                      |       |
| 趽      | 腐      | 剤      | . 5         | <b>*</b> 5       | <b>*</b> * | 泉(  | 及 4   | X ≱ | PJ      |          |     |     |   |   |   |   |   | 適                 | 盘                    |       |
|        |        |        |             |                  |            |     |       |     |         | た        | J.  | 牛   | ス |   |   |   |   |                   |                      | - 5.0 |
| 抽      | 出      | 法      | 1           | ~                | 3          | で   | 得     | 6   | ħ       | た<br>0 9 |     |     |   |   |   |   |   |                   |                      |       |
| 抽精     | 出製     | 法水     | 1<br>に      | ~<br>て           | 3          | で全  | 得量    | らを  | れ<br>10 |          | 6 8 | 느 - |   |   |   |   |   |                   |                      |       |
| 抽精〈    | 出製実    | 法水施    | 1<br>に      | ~<br>て<br>2      | 3 、        | で全  | 得量    | らを  | れ<br>10 | 0 9      | 6 8 | 느 - |   |   |   |   |   | 0.                |                      | - 5.0 |
| 抽精くス   | 出製実テ   | 法水施ァ   | 1<br>に<br>例 | ~<br>て<br>2<br>ン | 3 、        | で全  | 得量    | らを  | れ<br>10 | 0 9      | 6 8 | 느 - |   |   |   |   |   | 0.                | 3 ~<br>2 %           | - 5.0 |
| 抽精くスセ  | 出製実テ   | 法水施アノ  | 1 に例りー      | ~<br>て<br>2<br>ン | 3 、        | で全  | 得量    | らを  | れ<br>10 | 0 9      | 6 8 | 느 - |   |   |   |   |   | 0.                | 2 %                  | - 5.0 |
| 抽精くスセワ | 出製実テタセ | 法水施アノリ | 1 に例りー      | ~ て 2 ン ル        | 3、>酸       | で全乳 | 得 量 液 | らをの | れ<br>10 | 0 9      | 6 8 | 느 - |   |   |   |   |   | 0 .<br>0 .<br>1 . | 3 ~<br>2 %<br>5<br>0 | - 5.0 |

ポリオキシエチレンモノオレイン酸

10.0

流動パラフィン



| エステル                            | 2.0     | 精 製 水 に て 全 量 を 100% と す る 。 |
|---------------------------------|---------|------------------------------|
| 香料                              | 0.5     |                              |
| 防腐剤・酸化防止剤                       | 適量      |                              |
| グリセリン                           | 3.0     | •                            |
| ブロピレングリコール                      | 5.0     |                              |
| トリエタノールアミン                      | 1.0     |                              |
| 抽出法1~3により得られたエキス                | 0.3~5.0 | •                            |
| 精 製 水 に て 全 量 を 100% と す る 。    |         | •                            |
| < 実 施 例 3 > ク リ ー ム の 製 造 方 法   |         |                              |
| ステアリン酸                          | 2.0%    |                              |
| ステアリンアルコール                      | 7.0     |                              |
| 澄元 ラノリン                         | 2.0     |                              |
| スクワラン                           | 5.0     |                              |
| オクチルドデカノール                      | 6.0     |                              |
| ポリオキシエチレンセチルエーテル                | 3.0     |                              |
| 親 油 性 モ ノ ス テ ア リ ン 酸 グ リ セ リ ン | 2.0     |                              |
| 香料                              | 0.3     |                              |
| 防腐剤・酸化防止剤                       | 適量      |                              |
| プロピレングリコール                      | 5.0     | 出願人 株式会社ニチレイ                 |
| 抽出法1~3により得られたエキス                | 0.3~5.0 |                              |